



Partagez vos observations en scannant ce QR code ou sur [Inaturalist.org](https://www.inaturalist.org)

Rainette méridionale

Hyla meridionalis

ESPÈCE PROTÉGÉE*

TAILLE

5 - 7 cm

FORME, ALLURE

D'allure élancée, cet anoure présente une coloration généralement vert pomme, parfois brunâtre, exceptionnellement bleue. La peau du dos est parfaitement lisse (absence totale de boursoufflure).

Reconnaisable au masque brun à l'arrière de l'œil "comme Zorro", dans lequel le tympan est bien visible. Les pieds sont partiellement palmés et présentent des ventouses.

LONGÉVITÉ

Jusqu'à 15 ans

(c) Marion FRAYSSE GORLIER



COMMENT L'IDENTIFIER ?

Peau verte à brunâtre, peau parfaitement lisse, "trait de liner" noir



(c) Marion FRAYSSE GORLIER



(c) Jean-Pierre TROUILLAS

! Confusions possibles : Rainette verte (absente dans le Gard), Pélodyte ponctué (à la peau granuleuse), Grenouille verte (aspect plus trapu, peau légèrement granuleuse)

QUAND L'OBSERVER ?

J F M A M J J A S O N D

OÙ L'OBSERVER ?

- > Végétation arbustive et arborée
- > Aménagement urbains (bungalow, piscine, vitre, etc.)
- > Points d'eau stagnante à faiblement courante (mare, fossé, marais, gravière, etc.)
- > Pierriers, murets

MENACES ET ENJEUX

- Aménagement du territoire et disparition progressive de l'habitat terrestre et de son habitat aquatique.
- Modification climatique avec notamment des périodes d'assez plus longues et des assèchement plus précoces.
- Fragmentation et collisions routières.

BESOIN & ÉCOLOGIE DE L'ESPÈCE

Cette **petite espèce arboricole**, parfaitement adaptée avec son camouflage et ses ventouses, peut se retrouver dans son milieu terrestre en hauteur sur tous types de support, où elle se cache plus ou moins.

La période de **reproduction de février à avril** crée des regroupements dans les points d'eau. Les pontes sont reconnaissables et forment des amas d'une trentaine d'œufs.

De mœurs principalement nocturnes, il n'est cependant pas rare de l'entendre et de l'observer en pleine journée. Il reste très facile de la repérer grâce à son **chant très sonore, un "EUâââh" ou "Ouhai"** répété à intervalles réguliers toutes les 3 secondes environ.

TENDANCE RÉGIONALE & LOCALE

L'espèce présente une répartition européenne assez réduite au pourtour nord/ nord est méditerranéen. Très largement distribuée, elle est fréquente, excepté sur les secteur au dessus de 1000m d'altitude.

Observée sur le site, cette espèce "commune" devrait présenter une distribution plus importante.

Carte des données de Rainette méridionale avant 2025

